



GEBRUIK AED EN REANIMATIE



CONTROLEER HET BEWUSTZIJN

Schud zacht bij de schouder. Vraag luid om een reactie



PATIENT REAGEERT NIET

Maak de luchtwegen vrij en controleer de ademhaling

BIJ GEEN OF ABNORMALE ADEMHALING

Bel 112 en haal de AED

BIJ NORMALE ADEMHALING

Leg de patient in een comfortabele positie
Bel 112, blijf ademhaling controleren



START REANIMATIE

Plaats beide handen midden op de borstkas en geef 30 compressies.

- Duw minimum 5cm diep aan een snelheid van min 100/ minuut
- Sluit uw lippen rond de mond van de patient
- Blaas 2 x na elkaar geleidelijk tot de borst omhoog komt
- Start terug met 30 compressies



START DE AED EN BRENG DE PADS AAN


- Volg de gesproken instructies
- Bevestig 1 pad onder de linker oksel
- Bevestig 2de pad onder rechter sleutelbeen naast borstbeen
- Wanneer er een 2de persoon aanwezig is, stop reanimatie niet



DIEN SCHOK TOE

Niemand mag de patient aanraken

- Tijdens analyse door de AED
- Wanneer de schok wordt toegediend



VOLG VERDER DE GESPROKEN INSTRUCTIES

Reanimeer verder tenzij de patient bij bewustzijn komt, beweegt of terug normaal ademt.

Tijdens de opleiding EHBO wordt nog eens extra nadruk gelegd op het gebruik van AED